

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Кстининского отделения
агрофирмы «Двуречье»



Н.В. Петухова

2006 г.

АКТ

о применении мази ихтиоловой 10 % при лечении крупного рогатого скота

Мы, нижеподписавшиеся: главный ветеринарный врач Кстининского отделения агрофирмы «Двуречье» (Кирово-Чепецкий район Кировской области) Сунцова Т.Ф. и ветеринарный врач предприятия Ладухина Н.И. составили настоящий акт об использовании мази ихтиоловой 10 % производства ЗАО «НПП «Фармакс» при лечении хирургических заболеваний у крупного рогатого скота.

Ихтиоловая мазь применяется ветеринарными специалистами данного хозяйства для лечения животных в течение длительного времени (начиная с 1996 года). Показаниями для применения мази являются случайные раны в различных частях тела животных (чаще на конечностях), лечение дерматитов, экзем, фурункулёза, пиодермии и др. заболеваний кожи (ожоги и прочее).

Так как указанная мазь обладает антисептическими, противовоспалительными, сосудосуживающими и антиэкссудативными свойствами, а также ускоряет регенерацию повреждённых тканей, то её используют в первой и второй фазах раневого процесса, после хирургической обработки раны, нанося ровным тонким слоем на поражённую поверхность. Частота применения: 1 – 2 раза в сутки ежедневно или через 1 – 2 дня до выздоровления, в составе комплексного лечения или без него. Применение указанной мази для лечения дерматита особенно часто осуществляется при его гангренозных (некробактериозных) формах после удаления мертвых тканей и противомикробной обработки поражённой области. При острых микробных и околограневых экземах после стихания воспалительных и экссудативных явлений, а так же при хронических её формах ихтиоловую мазь используют для защиты кожных рецепторов от внешних раздражений, размягчения кожи, отторжения корочек и как антимикробное средство. Частота применения на фоне общего лечения (новокаиновая терапия, аутогемотерапия, витаминотерапия, применение препарата АСД фр. 3 и др.) та же, что указана выше. Лечение гнойных поражений кожи, таких как фурункулёз и пиодермия осуществляется путём ежедневного смазывания толстым слоем ихтиоловой мази созревающих гнойных очагов (фурункулов, микроабсцессов). После вскрытия и хирургической обработки их продолжают смазывать мазью 1 – 2 раза в сутки на фоне общего лечения до полного выздоровления.

В целом, применение ихтиоловой мази 10 % для лечения хирургической патологий у крупного рогатого скота в хозяйстве основано на вышеперечисленных её свойствах и осуществляется с соблюдением общепринятых принципов ветеринарной хирургии. За период использования данной мази не наблюдали каких-либо побочных действий у животных и отмечали должный терапевтический эффект от её применения. В таблице 1 представлены данные учёта применения 10 % ихтиоловой мази в хозяйстве при лечении хирургической патологии у животных в период с 2001 по 2005 год.

Таблица 1 – Данные о применении 10 % ихтиоловой мази за 2001 – 2005 годы

Заболевание	Количество животных, которым применялась ихтиоловая мазь, гол					
	2001 г	2002 г	2003 г	2004 г	2005 г	всего
Раны	32	24	31	28	21	136
Дерматиты	15	15	11	9	13	63
Экземы	7	5	6	6	5	29
Фурункулез, пиодермии	8	7	8	4	5	32
Ожоги и прочее	-	2	1	1	-	4

20 декабря 2006 года

Главный ветеринарный врач Кстининского отд. АФ «Дворечье»

Т.Ф. Сунцова

Т.Ф. Сунцова

Ветеринарный врач Кстининского отд. АФ «Дворечье»

Н.И. Ладухина

Н.И. Ладухина

