

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора



Е.А.НЕПОКЛОНОВ

12 ФЕВ 2014

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Мази стрептоцидовой 10 %
для лечения заболеваний кожи у животных

(Организация-разработчик ЗАО «НПП «Фармакс», г. Киров)

1. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Мазь стрептоцидовая 10 %
(Unguentum Streptocidi 10 %)

Международное непатентованное наименование: сульфаниламид (стрептоцид).

2. Лекарственная форма: мазь для наружного применения.

Мазь стрептоцидовая 10 % содержит в 100 г в качестве действующего вещества 10 г сульфаниламида (стрептоцида), в качестве вспомогательного вещества - вазелин медицинский или ветеринарный до 100 г.

По внешнему виду препарат представляет собой густую однородную массу от белого до светло-желтого цвета.

3. Выпускают Мазь стрептоцидовую 10 % расфасованной в тубы или банки из полимерных материалов, которые закрывают полимерными крышками с контролем вскрытия.

4. Хранят препарат в закрытой упаковке организации-производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 0° С до 25° С.

Срок годности Мази стрептоцидовой 10 % при соблюдении условий хранения - 5 лет со дня производства. Запрещается использовать Мазь стрептоцидовую 10 % после окончания срока годности.

5. Мазь стрептоцидовую 10 % следует хранить в недоступном для детей месте.

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Мазь стрептоцидовая 10 % относится к фармакотерапевтической группе антибактериальных препаратов для лечения заболеваний кожи.

Мазь стрептоцидовая 10 % обладает противомикробным действием, способствует ускорению процессов регенерации поврежденной ткани.

По степени воздействия на организм Мазь стрептоцидовая 10 % согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к малоопасным веществам (4 класс опасности).

III. Порядок применения

8. Мазь стрептоцидовую 10 % применяют животным для лечения заболеваний кожи (ран, язв, ожогов и других хирургических патологий).

9. Противопоказанием к применению Мази стрептоцидовой 10 % является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата (в том числе в анамнезе).

10. Мазь стрептоцидовую 10 % применяют животным наружно, нанося тонким слоем на пораженную поверхность или намазывают на стерильную марлевую салфетку и прикладывают к ране 1-2 раза в сутки в течение 7-10 дней в зависимости от тяжести поражения. При необходимости предварительно проводят туалет раны. Для предотвращения слизывания лекарственного препарата мелким животным надевают шейный воротник или накладывают бинтовую повязку.

11. Симптомы передозировки у животных не выявлены.

12. Особенности действия лекарственного препарата при первом приеме или его отмене не установлено.

13. Следует избегать нарушения схемы применения препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. При случайном увеличении интервала между двумя обработками препаратом, его следует нанести как можно быстрее.

14. Побочных явлений и осложнений при применении Мази стрептоцидовой 10 % в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам лекарственного препарата и появлении признаков раздражения кожи мазь снимают тампоном и обработку прекращают.

15. Мазь стрептоцидовую 10 % не следует применять одновременно с другими лекарственными препаратами для местного применения.

16. Продукцию животного происхождения, полученную от животных, обработанных Мазью стрептоцидовой 10 %, используют без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с лекарственным препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, необходимо промыть их большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Мазью стрептоцидовой 10 %. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в лечебное учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Пустые банки (тубы) из-под лекарственного препарата запрещается использовать для пищевых и бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: ЗАО «НПП «Фармакс», Россия, 610033, г. Киров, ул. Солнечная, д. 7.

Инструкция разработана: ЗАО «НПП «Фармакс», Россия, 610033, г. Киров, ул. Солнечная, д. 7.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Мази стрептоцидовой 10 %, утвержденная Россельхознадзором 3 ноября 2008 года..

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Номер регистрационного удостоверения ПВР-3-1.9/00162